


# rnidade



**3** Uma vez identificado o ponto de ligadura da vasectomia, retiram-se os pequenos segmentos fibrosos pela ligadura e faz-se a recanalização deste pequeno tubo.

**4** Para isso, são usados fios cirúrgicos muito finos, quase invisíveis a olho nu.

## O PÓS-OPERATÓRIO

- As preocupações principais ficam concentradas na primeira semana, em que um repouso relativo é necessário e, também, o uso de medicações individualizadas prescritas pelo médico que acompanha o caso, como anti-inflamatórios e analgésicos.
- Em alguns casos, após a reversão e o nascimento de um novo filho, pode existir a demanda de uma nova cirurgia de vasectomia, que pode ser realizada levando em conta os riscos intrínsecos de qualquer procedimento do tipo. Para tranquilizar os pacientes, o urologista Ferro afirma: “Na questão da vasectomia em si, tinha-se um receio, em alguns estudos, que poderia aumentar o risco de câncer de próstata, mas foi completamente desacreditado com novas pesquisas”.

Valdo Virgo/CB/D.A Press

## Palavra do especialista

### O que é a cirurgia de vasectomia, quais seus tipos e como funciona o procedimento de reversão?

A vasectomia é um procedimento cirúrgico com intuito de realizar a esterilização do paciente, interrompendo a ejaculação de espermatozoides. Existem algumas técnicas possíveis. Desde técnicas laparoscópicas até as cirurgias tradicionais, com abordagem pela bolsa testicular, que tem intuito de identificar o ducto deferente e impedir a passagem dos espermatozoides por esse ducto. Relativo à reversão, é possível. Pode ocorrer por meio de um procedimento cirúrgico, preferencialmente realizado por microscopia, que é mais complexo, e poucos urologistas têm treinamento para realizá-lo. O intuito é identificar o ponto de obstrução do ducto deferente realizado durante a vasectomia, removendo o ponto de obstrução e reconectando o ducto, assim, permitindo a passagem dos espermatozoides.

### Com relação às possibilidades de fertilidade após o procedimento, quais as chances? No caso de baixas, quais as alternativas?

As chances de sucesso na reversão são altas quando realizadas com uso da microscopia e pelas mãos de cirurgiões habilitados. A taxa de sucesso gira em torno de 80%. Nesses casos, são identificados espermatozoides no líquido ejaculado. Nos casos de falha do procedimento, ainda temos a opção de realizar a punção aspirativa do epidídimo (PESA) para captação de espermatozoides e posterior utilização destes espermatozoides em terapia de reprodução assistida (TRA).

### Quais os principais cuidados que devem ser tomados pelo paciente após a cirurgia? E quais medicações são mais indicadas?

Os cuidados no pós-operatório são os habituais de repouso, cuidados com a ferida operatória e, claro, seguir as orientações do médico que assiste o caso. Normalmente são utilizadas poucas medicações, principalmente analgésicos, como dipirona e paracetamol.

Tiago Serra é médico urologista do Urocentro