

estético



ALTERAÇÕES NA MORDIDA E NA ARCADA DENTÁRIA

- **Ausência ou posição inadequada dos dentes:** alguns dentes podem não se formar ou nascer fora da posição esperada.
- **Falta de espaço na arcada:** o desenvolvimento da arcada dentária pode ser comprometido, dificultando o posicionamento dos dentes.
- **Mordida cruzada:** ocorre quando alguns dentes superiores se posicionam por dentro dos inferiores durante a mordida.
- **Desalinhamento dentário:** os dentes podem apresentar alterações de posição e alinhamento.
- **Diferenças entre maxila e mandíbula:** o crescimento dos ossos da face pode ocorrer de maneira desigual, afetando a relação entre as duas estruturas.

TRATAMENTO E REABILITAÇÃO

- **Cirurgias:** a correção do lábio geralmente é realizada nos primeiros meses de vida, enquanto a cirurgia do palato costuma ocorrer posteriormente, conforme as condições de saúde e o desenvolvimento da criança.
- **Equipe multidisciplinar:** o acompanhamento pode envolver cirurgiões, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais, responsáveis por diferentes etapas da reabilitação, incluindo aspectos relacionados a fala, alimentação, saúde bucal e desenvolvimento.

Palavra do especialista

A fissura pode afetar o crescimento dos ossos da face?

Pode, sim, e traz consequências não só estéticas, mas também funcionais. A principal deficiência é no osso da maxila, pois ele costuma não desenvolver lateralmente e para frente, além do orifício que pode iniciar do nariz, passando pelo lábio, gengiva e seguir até o final do céu da boca (palato duro e mole). Isso traz desafios desde o nascimento, como impossibilidade de deglutição na amamentação, dificuldade fonética e atraso na fala, alterações mastigatórias por mal encaixe dentário e bloqueios respiratórios importantes.

Em quais situações é necessária uma cirurgia óssea durante o tratamento?

A cirurgia óssea pode ser necessária em diferentes fases. Na infância, é comum realizar o enxerto ósseo alveolar para reconstruir a região da fissura, permitindo a erupção adequada dos dentes permanentes e dando estabilidade ao arco dentário. Já após o término do crescimento, alguns pacientes apresentam uma deficiência importante da maxila e precisam de cirurgia ortognática para reposicionar os ossos da face, melhorando a mordida, a mastigação, a fala, a respiração e a harmonia facial.

O tratamento termina na infância ou pode continuar até a vida adulta?

O tratamento da fissura é um processo de longo prazo e, na maioria dos casos, acompanha o paciente desde o nascimento até a vida adulta. Ao longo desse período, podem ser necessárias diferentes intervenções, como cirurgias, ortodontia, fonoaudiologia, acompanhamento odontológico e, principalmente, emocional, para o paciente e seus familiares.

Magno Liberato é cirurgião bucomaxilofacial